

**Ocena ryzyka nawrotu nowotworu u chorych po resekcji pierwotnego nowotworu podścieliskowego przewodu pokarmowego (GIST)  
Grupy rokownicze o różnych lokalizacjach wg klasyfikacji AJCC-NCCN-AFIP.**

Parametry guza pierwotnego			Odsetek nawrotów po leczeniu chirurgicznym i ocena potencjału złośliwości							
Grupa rokownicza	Wielkość [cm]	Liczba mitotyczna (na 50 HPF)	GIST żołądka		GIST jelita cienkiego i grubego		GIST dwunastnicy		GIST odbytnicy	
<b>1</b>	≤2	≤5	0	Bardzo niski	0	Bardzo niski	0	Bardzo niski	0	Bardzo niski
<b>2</b>	>2≤5	≤5	1,9	Niski	4,3	Niski	8,3	Niski	4,3	Niski
<b>3a</b>	>5≤10	≤5	3,6	Niski	24	Pośredni	Brak danych*		Brak danych*	
<b>3b</b>	>10	≤5	12	Pośredni	<b>52</b>	<b>Wysoki</b>	<b>34</b>	<b>Wysoki</b>	<b>57</b>	<b>Wysoki</b>
<b>4</b>	≤2	>5	0	Niski	<b>50</b>	<b>Wysoki</b>	Brak danych*		<b>54</b>	<b>Wysoki</b>
<b>5</b>	>2≤5	>5	16	Pośredni	<b>73</b>	<b>Wysoki</b>	<b>50</b>	<b>Wysoki</b>	<b>52</b>	<b>Wysoki</b>
<b>6a</b>	>5≤10	>5	<b>55</b>	<b>Wysoki</b>	<b>85</b>	<b>Wysoki</b>	Brak danych*		Brak danych*	
<b>6b</b>	>10	>5	<b>86</b>	<b>Wysoki</b>	<b>90</b>	<b>Wysoki</b>	<b>86</b>	<b>Wysoki</b>	<b>71</b>	<b>Wysoki</b>

*Pogrubieniem oznaczono grupy o wysokim (≥50%) ryzyku nawrotu choroby po radykalnej resekcji nowotworu*

*\*żaden nowotwór z tej kategorii nie został uwzględniony w badaniu - Miettinen M., Lasota J. Gastrointestinal stromal tumors: Pathology and prognosis at different sites. Seminars in Diagnostic Pathology 2006; 23: 70-83*

*HPF ( ang. High power field) – pole w dużym powiększeniu ( x400)*

